



Super Zinc Flow®

COMPOSICIÓN:	P/P	P/V
Zinc	4%	38 %

pH: 9,2 Densidad: 1,66 g/ml

LEA INTEGRAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

SENSA N°: 18.995

AKO™: Garantiza la calidad y estabilidad siempre que el mismo esté conservado en su envase íntegro y original, almacenado sin exposición a temperaturas extremas y en lugar seco, no se responsabiliza por accidentes, daños, perjuicios y/o resultados insatisfactorios derivados de un uso incorrecto o distinto al indicado en este rótulo.

LOTE: VER EN ENVASE
VCTO: VER EN ENVASE

CONT. NETO

10 Lt

ORIGEN: ARGENTINA

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Alfalfa	0,33 L/ha	Aplicados al comienzo de la temporada de crecimiento. Repetir 2 a 3 semanas más tarde a las mismas dosis.
Algodón	0,3 a 1L/ha	Aplicar de 3 a 4 semanas post emergencia. Repetir si es necesario a intervalos de 10 a 14 días.
Arándano	1 L/ha	Solo para arándanos altos. Aplicar justo antes del comienzo de caída de hojas. Repetir la aplicación durante la apertura de yemas en la siguiente temporada de fructificación.
Aroz	1 L/ha	Aplicar al inicio del muestaje y al inicio de formación de la panícula.
Caña de azúcar	1 L/ha	Aplicar cuando la caña mide entre 90 y 120 cm de altura. Se puede repetir en caso de necesidad en intervalos de 10 a 14 días.
Cítricos	1 L/ha	Aplicar en brotaciones de primavera y de otoño. Se puede repetir a intervalos de 10-14 días en caso de necesidad.
Soja	0,5 a 1L/ha	Aplicar cuando las plantas miden entre 5 hasta 15cm.
Frutilla	0,5 L/ha	Aplicar en fase de yemas verdes, seguidas de 2 aplicaciones de 0,25 L/ha en fase de yemas blancas y en el rebrote post cosecha.
Papa	1 L/ha aéreo: 0,33 L/ha	Aplicar una semana después de 100% emergencia. Para deficiencias moderadas a severas, se puede repetir en intervalos de 10 a 14 días. También, 1 L/ha luego de análisis de peciolo, durante llenado de bulbos.
Girasol	0,6 L/ha	A 2 pares de hojas.
Cereales	0,5 a 1 L/ha	Aplicar desde 2 hojas hasta el primer nudo.
Cereza	1 a 2 l/ha	Aplicar una semana después de 100% emergencia. Para deficiencias moderadas a severas, se puede repetir en intervalos de 10 a 14 días. También, 1 L/ha luego de análisis de peciolo, durante llenado de bulbos.
Maíz	0,5-1 L/ha	De 3 a 8 hojas. Con deficiencias severas repetir la aplicación 10 a 14 días después.
Almendro	1 L/ha	Aplicar desde yema hinchada. Repetir post cosecha, antes de la senescencia foliar.
Brócoli, Espinaca	1 a 2 L/ha	En 4 – 9 hojas.
Ciruella, Durazno	0,5 a 0,75 L/ha	Aplicar en brotes de 10 a 20 cm, mas una repetición 15 a 20 días más tarde.
Té	0,3 a 1 L/ha	Realizar dos a seis aplicaciones en dosis durante la temporada de la cosecha en intervalos de 30 días.
Tomate	0,3 a 1 L/ha	En 4-6 hojas. Repetir a intervalos de 10 a 14 días si es necesario.
Nogal	1 L/ha	A partir de la brotación de primavera. En caso de necesidad repetir la misma dosis 15 días más tarde.

Se recomienda utilizar una dosis comprendida entre 0,04 a 1,5% v/v
pH óptimo de aplicación 5,5 a 6,5

ESTE PRODUCTO ES UN COMPLEMENTO Y NO UN SUSTITUTO DE LA FERTILIZACIÓN DE FONDO AL SUELO.
NO APLICAR EN DÍAS CALUROSO O DE GRAN INSOLACIÓN.
UTILIZAR CONJUNTAMENTE CON EL AGREGADO DE UN TENSIOACTIVO NO IÓNICO, NO POLAR EN UNA CONCENTRACIÓN DEL 0,5% AL 0,1% O CONJUNTAMENTE CON AGROQUÍMICOS.
ESTAS DOSIS SON INDICATIVAS, PIDIÉNDOSE VARIAS SEGUN ANÁLISIS DE SUELO Y/O FOLIAR Y EL CONSEJO DEL INGENIERO AGRÓNOMO DE LA ZONA.

NOTA: SE DEBERA MANTENER LA SUSPENSIÓN CON AGITACIÓN CONSTANTE. UNA VEZ TERMINADA LA APLICACIÓN, SE DEBERA LAVAR EL EQUIPO Y SISTEMA DE CONDUCCIÓN CON AGUA LIMPA.

DILUCIÓN: Después de una perfecta limpieza, llenar el tanque del pulverizador hasta la mitad, agregando a continuación el SUPER ZINC FLOW con agitación. Mantener la agitación del tanque hasta el final del tratamiento.

COMPATIBILIDAD: SUPER ZINC FLOW, puede pulverizarse en asociación con muchos de los productos fitosanitarios empleados comúnmente. Se recomienda realizar un test previo.

Para mayor información consulte con su Ingeniero Agrónomo.

EN CASO DE INTOXICACIÓN

- Centro Toxicológico de Hospital Municipal de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (Buenos Aires). Tel: (011) 4962-6666 y 4962-2247.
- Hospital Clínicas José de San Martín: Tel: (011) 4950-8804 y 4950-8806.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas (Barrilo): Tel: (011) 4654-6648, 4658-7777, 4658-3001 al 3019 (int. 1102 y 1103).
- Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde: Tel: (011) 4300-2115 y 4307-5842 (int. 72).
- Centro de Consultas Toxicológicas TAS, atención las 24 hs. (0341) 448-0077 y 424-2727.



akoagro.com

AKO S.R.L: Av. ELPIDIO GONZALEZ 1100
PARQUE INDUSTRIAL - VILLA ALLENDE - CÓRDOBA -
REPÚBLICA ARGENTINA - TEL.: 03543-434628

