



Ako Humic®

LEA INTEGRAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

COMPOSICIÓN:	P/P
Nitrógeno total (N)	10,0%
Fósforo soluble en agua (P)	5,0%
Potasio soluble (K)	2,0%
Cobre (Cu)	0,05%
Manganeso (Mn)	0,05%
Zinc (Zn)	0,06%
Extracto húmico total sobre producto húmedo	2,6%
Ácidos fúlvicos	1,0%

Contiene trazas de: Calcio, Magnesio, Hierro, Boro.

Grado: 10 - 5 - 2 Grado equivalente: 10 - 12 - 2 pH: 6,6 Densidad: 1,20 g/ml

SENASA N°: 18.997

LOTE: VER EN ENVASE
VCTO: VER EN ENVASE

CONT. NETO

10 Lt

ORIGEN: ARGENTINA

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Papa	2,5 - 4 l/ha	Primera aplicación cuando el cultivo cuente con 20 cm. Aplicar nuevamente en pre floración y a los 15 días posteriores.
Tomate, Apio, Arveja (grano consumo) Poroto (grano consumo)	2,5 - 4 l/ha	Aplicar a los 15 días del trasplante, usar dosis bajas. Aplicar en dos ocasiones más antes de la floración y 2 más entre la fructificación. En siembra directa, cuando el cultivo cuente con superficie foliar. Aplicar a los 20 - 30 días después de la emergencia. Cerca de la floración y al iniciar la formación de vainas.
Frutales: Manzano, Pera, Arándano, Durazno, Cítricos en general, Uva de mesa.	600 - 1.000 cc/100 l de agua	En plantaciones jóvenes: una aplicación mensual. En plantaciones grandes: después del corte, en pre floración y cuando el fruto esté en desarrollo.
Florales y Ornamentales	1 Lt/ 100 l de agua	Realizar una aplicación cuando el cultivo este en desarrollo y pre floración.

Se recomienda utilizar una dosis comprendida entre 0,6 a 1 % v/v
"MANTENER CALDO DE APLICACIÓN CON AGITACIÓN CONSTANTE"

Este producto es un complemento y no un sustituto de la fertilización de fondo (al suelo). No aplicar en días calurosos o de gran insolación.

Utilizar conjuntamente con el agregado de un tensioactivo no iónico, no polar en una concentración del 0,5% AI 0,1% o conjuntamente con agroquímicos.

Estas dosis son indicativas, pudiéndose variar según análisis de suelo y/o foliar y el consejo del ingeniero agrónomo de la zona.

Dilución: agite antes de utilizar.

Después de una perfecta limpieza, llenar el tanque del pulverizador hasta la mitad, agregando a continuación el **AKO HUMIC** con agitación. Mantener la agitación del tanque hasta el final del tratamiento.

Para mayor información consulte con su Ingeniero Agrónomo.

AKO™: Garantiza la calidad y estabilidad siempre que el mismo esté conservado en su envase íntegro y original, almacenado sin exposición a temperaturas extremas y en lugar seco, no se responsabiliza por accidentes, daños, perjuicios y/o resultados insatisfactorios derivados de un uso incorrecto o distinto al indicado en este rótulo.

EN CASO DE INTOXICACIÓN

•Centro Toxicológico de Hospital Municipal de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (Buenos Aires): Tel.: (011) 4962-6666 y 4962-2247.

•Hospital Clínicas José de San Martín: Tel.: (011) 4950-8804 y 4950-8806.

•Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas (Buenos Aires): Tel.: (011) 4654-6648, 4658-7777, 4658-3001 al 3019 (int. 1102 y 1103).

•Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde: Tel.: (011) 4300-2115 y 4307-6842 (int. 72).

•Centro de Consultas Toxicológicas TAS, atención las 24 hs. (0341) 448-0077 y 424-2727.

akoagro.com

AKO S.R.L.: Av. ELPIDIO GONZALEZ 1100
PARQUE INDUSTRIAL - VILLA ALLENDE - CÓRDOBA -
REPÚBLICA ARGENTINA - TEL.: 03543-434628

