



Ako Boro®

COMPOSICIÓN:	P/P	P/V
Boro	10%	13.1%

pH: 8,6 Densidad: 1,35 g/ml

Detalle del producto:

Ako Boro: contiene 10% de boro de gran solubilidad en agua recomendado para cubrir deficiencias del mismos en todos los cultivos.

LEA INTEGRAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

SENSA N°: 18.583

AKO™: Garantiza la calidad y estabilidad siempre que el mismo esté conservado en su envase íntegro y original, almacenado sin exposición a temperaturas extremas y en lugar seco, no se responsabiliza por accidentes, daños, perjuicios y/o resultados insatisfactorios derivados de un uso incorrecto o distinto al indicado en este rótulo.

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Maíz, Sorgo, Trigo, Arroz	1 lt/ha	2 aplicaciones a los 30 y 45 días post-emergencia
Poroto, Algodón, Soja, Maní	1 lt/ha	2 aplicaciones a los 25 y 40 días post-emergencia
Cítricos	0,5 lts / 1000 lts de agua	3 aplicaciones durante el año
Manzana, Pera, Vid, Frutales en gral.	0,1 lts/100 lts de agua	3 aplicaciones por año. 1° en post-cosecha, 2° en prefloración y 3° post cuaje
Café, Cacao	1 lt por 1000 plantas o por ha	3 aplicaciones durante el año
Tomate, Pimiento, Hortalizas, Melón, Zapallo, Sandía	200 ml/ 100 lts de agua	4 aplicaciones cada 15 días iniciado el tratamiento con la 1ª aplicación de plaguicidas.
Papa	300 ml/ 100 lts de agua	3 aplicaciones a los 20, 35 y 50 días post-emergencia
Ajo, Cebolla	200 ml/ 100 lts de agua	Aplicaciones quincenales
Floricultura	100 ml/ 100 lts de agua	4 aplicaciones durante el ciclo de la planta
Caña de Azúcar	2 lts/ha	1 aplicación 40 días posterior al inicio de brotación
Pasturas	2 lts/ha	1 aplicación al inicio de la brotación
Tabaco	1 lt/ha	2 aplicaciones a los 35 y 40 días desde el trasplante
Girasol	2 lts/ha	2 aplicaciones a los 30 y 50 días post-emergencia
Frutilla	100 ml/ 100 lts de agua	2 aplicaciones quincenales desde prefloración

Propiedades:

- Activador del metabolismo de carbohidratos.
- Actúa en la formación de paredes celulares.
- Mejora el transporte de azúcares.
- Mejora el desarrollo del tubo polínico la producción de granos de polen.
- Estimula la formación de fitohormonas.

Importante:

Las principales deficiencias del boro los excesos de lluvias, suelos alcalinos, bajos en materia orgánica, por eso una buena complementación de boro a los cultivos vía foliar mejoran la performance de los mismos.

Modo de uso: Ako Boro es de aplicación específico como fertilizante. Agitar antes de usar.

Foliar: En aplicaciones con plaguicidas es recomendable respetar el orden de carga.

1. Agua / 2. AKO BORO Agroquímicos.

Es recomendable no aplicar en días de altas temperaturas o en horarios de alta insolación.

EN CASO DE INTOXICACIÓN

• Centro Toxicológico de Hospital Municipal de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (Buenos Aires): Tel.: (011) 4962-6666 y 4962-2247.

• Hospital Clínicas José de San Martín: Tel.: (011) 4950-8804 y 4950-8806.

• Centro Nacional de Intoxicaciones Policlinica Prof. A. Posadas (Hsdo): Tel.: (011) 4654-6648, 4658-7777, 4658-3001 al 3019 (int. 1102 y 1103).

• Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde: Tel.: (011) 4300-2115 y 4307-5842 (int. 72).

• Centro de Consultas Toxicológicas TAS, atención las 24 hs. (0341) 448-0077 y 424-2727.

LOTE: VER EN ENVASE
VCTO: VER EN ENVASE

CONT. NETO

5 Lt

ORIGEN: ARGENTINA



akoagro.com

AKO S.R.L.: Av. ELPIDIO GONZALEZ 1100
PARQUE INDUSTRIAL - VILLA ALLENDE - CÓRDOBA -
REPÚBLICA ARGENTINA - TEL.: 03543-434628

