

FERTILIZANTE INORGÁNICO
COMPLEJO FOLIAR LÍQUIDO

 **nanocover max®**

TECNOLOGÍA
 **nanocover®**



Composición

P/P

Nitrógeno (N)	7%
Fósforo Asimilable (P)	3%
Potasio (K)	3%
Azufre de Sulfatos (S)	0,4%
Boro (B)	0,1%
Zinc (Zn)	0,2%
Hierro (Fe)	0,3%
Manganeso (Mn)	0,1%
Molibdeno (Mo)	0,02%
Cobalto (Co)	0,001%

Grado: 7 – 3 – 3
pH: 3,2

Grado equivalente: 7 – 7 - 4
Densidad: 1,180 g/ml

SENASA N°: 60.435

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Este producto es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes de aplicación común incorporados al suelo.

Se deberá utilizar conjuntamente con el agregado de un tensioactivo, de acuerdo a las indicaciones del mismo o conjuntamente con agroquímicos.

No aplicar en horas de calor o máxima insolación.

Estas dosis son indicativas, pudiéndose variar según análisis de suelo y/o foliar y el consejo del ingeniero agrónomo de la zona.

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común, sin embargo, de existir duda sugerimos hacer una prueba a pequeña escala.

Utilizar equipos de protección personal y contar con hoja de seguridad informando el valor de pH.

Asegurar adecuada ventilación.

No almacenar con combustibles, productos corrosivos o inflamables, ni con materiales orgánicos.

No fumar.

Dilución: después de una perfecta limpieza, llenar el tanque del pulverizador hasta la mitad, agregando a continuación el NANOCOVERT Max con agitación. Mantener la agitación del tanque hasta el final del tratamiento.

Para mayor información consulte con su ingeniero agrónomo.


INSTRUCCIONES DE USO DOSIS Y APLICACIÓN:

Cultivo	Dosis	Aplicación.
Maíz	100 – 500 cc/100 L de agua	1 a 2 aplicaciones entre V3 - V6
Trigo - Cebada	250 – 450 cc/100 L de agua	1 a 2 aplicaciones desde macollaje
Arroz	250 – 450 cc/100 L de agua	1 a 2 aplicaciones desde macollaje
Soja	100 – 500 cc/100 L de agua	1 a 2 aplicaciones durante el ciclo del cultivo según requerimientos
Girasol	100 – 500 cc/100 L de agua	1 a 2 aplicaciones durante el ciclo del cultivo según requerimientos
Poroto - Garbanzo	100 – 500 cc/100 L de agua	1 a 2 aplicaciones durante el ciclo del cultivo según requerimientos
Tomate - Pimiento	100 – 500 cc/100 L de agua	Aplicaciones cada 7 – 10 días durante todo el ciclo del cultivo según requerimiento
Hortalizas	100 – 500 cc/100 L de agua	Aplicaciones cada 7 – 10 días durante todo el ciclo del cultivo según requerimiento
Frutales	250 – 500 cc/100 L de agua	3 aplicaciones al año según requerimiento
Pasturas	250 – 500 cc/100 L de agua	Aplicación 10 días luego del corte

pH óptimo de aplicación 5,5 a 6,5

Ajustar la solución con un regulador de pH o acidificante hasta llegar al pH óptimo de aplicación.

AGITE ANTES DE UTILIZAR



LOTE: VER EN ENVASE
VCTO: VER EN ENVASE

1Lt

ORIGEN: ARGENTINA

DESARROLLO CONJUNTO



akoagro.com

AKO S.R.L.: Av. ELPIDIO GONZALEZ 1100
PARQUE INDUSTRIAL - VILLA ALLENDE - CÓRDOBA
REPÚBLICA ARGENTINA - TEL.: 03543-434628

UN PRODUCTO DESARROLLADO POR AKO AGRO.

EN CASO DE INTOXICACIÓN

- Centro Toxicológico de Hospital Municipal de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (Buenos Aires): Tel: (011) 4962-6666 y 4962-2247.
- Hospital Clínicas José de San Martín: Tel: (011) 4950-8804 y 4950-8806.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof A. Posadas (Haedo): Tel: (011) 4654-6648, 4658-7777, 4658-3001 al 3019 (int. 1102 y 1103).
- Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde: Tel: (011) 4300-2115 y 4307-5842 (int. 72).
- Centro de Consultas Toxicológicas TAS, atención las 24 hs. (0341) 448-0077 y 424-2727.