



Super Zinc Flow®

COMPOSICIÓN:	P/P	P/V
Zinc (Zn)	38%	65 %

pH: 9,2 Densidad: 1,66 g/ml

LEA INTEGRAMENTE ESTE ROTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

SENASA N°: 18.995

AKO™: Garantiza la calidad y estabilidad siempre que el mismo esté conservado en su envase íntegro y original, almacenado sin exposición a temperaturas extremas y en lugar seco, no se responsabiliza por accidentes, daños, perjuicios y/o resultados insatisfactorios derivados de un uso incorrecto o distinto al indicado en este rótulo.

LOTE: VER EN ENVASE
VCTO: VER EN ENVASE

CONT. NETO

10 Lt

ORIGEN: ARGENTINA



akoagro.com

AKO S.R.L: Av. ELPIDIO GONZALEZ 1100
PARQUE INDUSTRIAL - VILLA ALLENDE - CÓRDOBA -
REPÚBLICA ARGENTINA - TEL.: 03543-434628

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Alfalfa	0,33 L/ha	Aplicados al comienzo de la temporada de crecimiento. Repetir 2 a 3 semanas más tarde a las mismas dosis.
Algodón	0,3 a 1 L/ha	Aplicar de 3 a 4 semanas post emergencia. Repetir si es necesario a intervalos de 10 a 14 días.
Arándano	1 L/ha	Solo para arándanos altos. Aplicar justo antes del comienzo de caída de hojas. Repetir la aplicación durante la apertura de yemas en la siguiente temporada de fructificación.
Aroz	1 L/ha	Aplicar al inicio del macollaje y al inicio de formación de la panícula.
Caña de azúcar	1 L/ha	Aplicar cuando la caña mide entre 30 y 120 cm de altura. Se puede repetir en caso de necesidad en intervalos de 10 a 14 días.
Cítricos	1 L/ha	Aplicar en brotaciones de primavera y de otoño. Se puede repetir a intervalos de 10-14 días en caso de necesidad.
Soja	0,5 a 1 L/ha	Aplicar cuando las plantas miden entre 5 hasta 15cm.
Frutilla	0,5 L/ha	Aplicar en fase de yemas verdes, seguidas de 2 aplicaciones de 0,25 L/ha en fase de yemas blancas y en el rebrote post cosecha.
Papa	1 L/ha aéreo: 0,33 L/ha	Aplicar una semana después de 100% emergencia. Para deficiencias moderadas a severas, se puede repetir en intervalos de 10 a 14 días. También, 1 L/ha luego de análisis de peciolo, durante llenado de bulbos.
Girasol	0,6 L/ha	A 2 pares de hojas.
Cereales	0,5 a 1 L/ha	Aplicar desde 2 hojas hasta el primer nudo.
Cereza	1 a 2 L/ha	Aplicar una semana después de 100% emergencia. Para deficiencias moderadas a severas, se puede repetir en intervalos de 10 a 14 días. También, 1 L/ha luego de análisis de peciolo, durante llenado de bulbos.
Maíz	0,5-1 L/ha	De 3 a 8 hojas. Con deficiencias severas repetir la aplicación 10 a 14 días después.
Almendro	1 L/ha	Aplicar desde yema hinchada. Repetir post cosecha, antes de la senescencia foliar.
Brócoli, Espinaca	1 a 2 L/ha	En 4 – 9 hojas.
Ciurela, Durazno	0,5 a 0,75 L/ha	Aplicar en brotes de 10 a 20 cm, mas una repetición 15 a 20 días más tarde.
Té	0,3 a 1 L/ha	Realizar dos a seis aplicaciones en dosis durante la temporada de la cosecha en intervalos de 30 días.
Tomate	0,3 a 1 L/ha	En 4-6 hojas. Repetir a intervalos de 10 a 14 días si es necesario.
Nogal	1 L/ha	A partir de la brotación de primavera. En caso de necesidad repetir la misma dosis 15 días más tarde.

Se recomienda utilizar una dosis comprendida entre 0,04 a 1,5% v/v
pH óptimo de aplicación 5,5 a 6,5

ESTE PRODUCTO ES UN COMPLEMENTO Y NO UN SUSTITUTO DE LA FERTILIZACIÓN DE FONDO (AL SUELO).
NO APLICAR EN DÍAS CALUROSO O DE GRAN INSOLACIÓN.
UTILIZAR CONJUNTAMENTE CON EL AGREGADO DE UN TENSIOACTIVO NO IÓNICO, NO POLAR EN UNA CONCENTRACIÓN DEL 0,5% AL 1% O CONJUNTAMENTE CON AGROQUÍMICOS.
ESTAS DOSIS SON INDICATIVAS. PIDIÉNDOSE VARIAS SEGÚN ANÁLISIS DE SUELO Y/O FOLIAR Y EL CONSEJO DEL INGENIERO AGRÓNOMO DE LA ZONA.

NOTA: SE DEBERÁ MANTENER LA SUSPENSIÓN CON AGITACIÓN CONSTANTE. UNA VEZ TERMINADA LA APLICACIÓN, SE DEBERÁ LAVAR EL EQUIPO Y SISTEMA DE CONDUCCIÓN CON AGUA LIMPIA.

DILUCIÓN: Después de una perfecta limpieza, llenar el tanque del pulverizador hasta la mitad, agregando a continuación el **SUPER ZINC FLOW** con agitación. Mantener la agitación del tanque hasta el final del tratamiento.

COMPATIBILIDAD: **SUPER ZINC FLOW**, puede pulverizarse en asociación con muchos de los productos fitosanitarios empleados comúnmente. Se recomienda realizar un test previo.

Para mayor información consulte con su Ingeniero Agrónomo.

EN CASO DE INTOXICACIÓN

- Centro Toxicológico de Hospital Municipal de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (Buenos Aires). Tel.: (011) 4962-6666 y 4962-2247.
- Hospital Clínicas José de San Martín: Tel.: (011) 4950-8804 y 4950-8806.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas (Buenos Aires): Tel.: (011) 4654-6648, 4658-7777, 4658-3001 al 3019 (int. 1102 y 1103).
- Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde: Tel.: (011) 4300-2115 y 4307-5842 (int. 72).
- Centro de Consultas Toxicológicas TAS, atención las 24 hs. (0341) 448-0077 y 424-2727.

